

תלונה - הפרעות עוריות



בזמן תחלואת קורונה בשלב החריף ייתכן ביטוי עורי בצורת מופע של נגעים כגון - vesicular eruptions, petechial/purpuric rashes, acral lesions, livedoid lesions, urticarial rashes, and maculopapular-erythematous rashes.

הימשכות הנגעים העוריים הללו גם לאחר תקופת ההחלמה יחשבו כ- Cutaneous long COVID. לא ניתן לחזות אילו מהממצאים העוריים שהופיעו בשלב החריף של COVID ימשכו באופן כרוני / מתמשך. נגעים מסוג pernio lesions הם ככל הנראה אלו שמשויכים בצורה הסבירה ביותר ל Cutaneous long COVID.

מופע עורי נוסף הוא COVID alopecia שלרוב נובע מתגובה ללחץ והמתח המלווים לתחלואת COVID. ישנם דיווחים על אובדן שיער בעד 22% מהחולים.

אנמנזה



- האם המחלה העורית הייתה לפני הדבקה ב COVID או התפרצה אחריה?
- אפיון הנגעים (המיקום, צבע, פיזור, אופי הנגע וכו')



בדיקה גופנית



בדיקה גופנית לרבות עורית מקיפה

טיפול תסמיני ברמת המרפאה



טיפול בדומה לנגעים עוריים דומים שאינם כתוצאה מהדבקה ב COVID

הפניה לבדיקות עזר




במקרים של העדר תגובה לטיפול יש לשקול הפניה לרופא עור להמשך הערכה וטיפול

"דגלים אדומים"



- מעורבות עורית שהיא חלק ממחלה סיסטמית זיהומית שאינה קשורה ל Long COVID
- אבחנה מבדלת הכוללת זיהום נרחב, ספסיס, וסקוליטיס
- מחלה עורית המצריכה הערכה דחופה גם אילולי הקורונה



תיאורי מקרה



מטופל בן 40 לאחר מחלת קורונה קלה. כ 5 שבועות טרם קבלתו, מופע של פריחה מקולפפולרית על הגב ללא הסבר גם לאחר תשאול מדוקדק, בדיקה ובדיקות דם. הותחל טיפול באנטי-היסטמינים. לאחר מספר ימים הפריחה חלפה ללא הישנות.

מטופל בן 60 כ 3 חודשים אחרי מחלת קורונה. התקבל בשל פריחה פפורילית בגפיים שאינה נעלמת בלחיצה, בעלת צבע סגול-אדום. הפריחה הופיעה לפני כיממה, מלווה בחום עד 39. המטופל הופנה למלר"ד להמשך הערכה ובירור, שם אובחן עם בקטרמיה וספסיס ואושפז לטיפול.

סיכום



כל סוגי הפרעות העור יכולות להתפתח אחרי מחלת קורונה. לעיתים תתכן החמרה של מחלה קודמת. הטיפול בנגעים העוריים הוא בהתאם לממצא הקליני, ואין טיפול שהוא ספציפי לנגעי עור מקורונה. יש לשים לב גם ל COVID ALOPECIA שמתוארת אחרי מחלת הקורונה.

הנחיות אלו לא נועדו להחליף שיקול רפואי קליני ואבחנה מבדלת לתסמונת Long COVID.

